

PROCESSO SELETIVO – EDITAL nº 004/2011

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAMU

I N S T R U Ç Õ E S

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. Assine-o. Transcreva os dados nos quadros abaixo e assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de exclusão do candidato do Processo Seletivo.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal, pelo candidato, após terminar a sua prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

Tome café para afastar a tristeza

Render-se ao cafezinho oferece mais vantagens do que simplesmente mandar a moleza embora. Segundo cientistas da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, consumi-lo com regularidade também afugenta a depressão.

MANARINI, Thaís. Tome café para afastar a tristeza. *Saúde é vital*. São Paulo: Abril, ed. 343, novembro 2011. p. 14.

01) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Em “Render-se ao cafezinho...”, o item sublinhado é:

- A () pronome indefinido
- B () pronome indeterminado
- C () palavra expletiva ou de realce
- D () índice de indeterminação do sujeito
- E () pronome reflexivo

02) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Em “... consumi-lo com regularidade...”, o item sublinhado é um pronome:

- A () pessoal do caso oblíquo
- B () pessoal do caso reto
- C () possessivo
- D () indefinido
- E () relativo

03) Numere a **coluna 2** de acordo com a **coluna 1**.

COLUNA 1	COLUNA 2
I - café	() substantivo formado a partir de um adjetivo
II - moleza	() substantivo formado a partir de outro substantivo
III - cafezinho	() substantivo abstrato
IV - tristeza	() substantivo comum

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () II – III – I – IV
- B () II – III – IV – I
- C () I – II – III – IV
- D () III – IV – I – II
- E () IV – III – I – II

04) Em “Segundo cientistas da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, ...”, o vocábulo sublinhado:

1. não tem função de numeral na frase.
2. pode ser substituído por “De acordo com...” sem que haja alteração de significado.
3. é um numeral ordinal usado para encurtar a frase. A forma mais completa seria “Em segundo lugar, ...”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
B () Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
C () Apenas a afirmativa 1 está correta.
D () Apenas a afirmativa 2 está correta.
E () Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

05) Considere as palavras sublinhadas na frase abaixo e, em seguida, numere a **coluna 2** de acordo com a **coluna 1**.

Istambul, metrópole cultural da Turquia, conserva as marcas das civilizações que a ocuparam.

COLUNA 1	COLUNA 2
I - Istambul	() adjetivo
II - metrópole	() substantivo comum
III - cultural	() verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo
IV - que	() substantivo próprio
V - ocuparam	() pronome relativo

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () I – III – IV – V – II
B () III – II – V – IV – I
C () III – II – V – I – IV
D () I – II – III – V – IV
E () IV – II – V – I – III

06) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Na frase “Istambul, metrópole cultural da Turquia, conserva as marcas...”, a expressão sublinhada constitui um:

- A () vocativo
B () complemento nominal
C () sujeito composto
D () predicado
E () aposto

07) Assinale a alternativa CORRETA.

De acordo com o texto, na frase “Tome café para afastar a tristeza”, o verbo sublinhado encontra-se no modo imperativo para:

- A () exprimir uma ordem
- B () fazer um convite
- C () exprimir uma proibição
- D () exprimir um conselho
- E () solicitar licença

08) Assinale a alternativa CORRETA.

Na frase “Tome café para afastar a tristeza”, a expressão sublinhada constitui um:

- A () objeto indireto
- B () objeto direto
- C () adjunto adnominal
- D () adjunto adverbial
- E () complemento nominal

09) Qual(is) item(ns) abaixo apresenta(m) os dois adjetivos uniformes, ou seja, aqueles que têm a mesma forma tanto no masculino quanto no feminino?

1. simples – triste
2. cultural – pública
3. mole – completo

Assinale a alternativa CORRETA.

- A () Apenas o item 2.
- B () Apenas o item 3.
- C () Apenas o item 1.
- D () Apenas os itens 1 e 2.
- E () Apenas os itens 1 e 3.

10) Assinale a alternativa CORRETA.

Qual dos substantivos abaixo apresenta uma significação no masculino e outra no feminino?

- A () chefe
- B () paciente
- C () artista
- D () presidente
- E () cabeça

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11) Na avaliação inicial à vítima traumatizada, uma das terminologias utilizadas é o método mnemônico ABCDE (iniciais dos termos em inglês: *Air way, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*), que determina a progressão lógica de avaliação e tratamento, de acordo com a ordem de prioridade identificada.

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre a avaliação do traumatizado, contemplando a ordem de prioridade baseada no método ABCDE.

- A () Vias aéreas e controle da coluna cervical; respiração e ventilação; circulação e controle de sangramentos; exposição, exame físico e entrevista; incapacidades.
- B () Vias aéreas e controle da coluna cervical; respiração e ventilação; circulação e controle de sangramentos; incapacidades ou avaliação neurológica; exposição, exame físico e entrevista.
- C () Vias aéreas e controle da coluna cervical; respiração e ventilação; despir completamente a vítima e protegê-la contra hipotermia; circulação com controle de hemorragia; avaliação da incapacidade e exame neurológico.
- D () Despir completamente a vítima e protegê-la contra hipotermia; vias aéreas e controle da coluna cervical; respiração e ventilação; circulação.
- E () Vias aéreas e controle da coluna cervical; ventilação e respiração; circulação e controle de sangramentos; entrevista; exame físico e incapacidades.

- 12) A boa avaliação é a base para um atendimento pré-hospitalar de qualidade e é extremamente dependente do julgamento clínico, dos conhecimentos técnicos e das habilidades do profissional no domínio da técnica.

Sobre a avaliação, analise as afirmativas abaixo.

- I - A avaliação da vítima de trauma compreende a avaliação primária e a avaliação secundária, composta por uma sequência lógica de etapas (ABCDE). A avaliação primária tem como objetivo detectar problemas que coloquem a vida da vítima em risco iminente, mas nas fases desta avaliação não se faz nada. Somente na avaliação secundária se busca corrigir os problemas identificados.
- II - O método mnemônico ABCDE é uma dentre as terminologias usadas para resumir, de forma simples e ordenada, a sequência da avaliação inicial e secundária, determinando a progressão lógica destas avaliações e a intervenção nos problemas identificados.
- III - As fases do ABCDE correspondem respectivamente às seguintes ações: A = via aérea e controle da coluna cervical, B = respiração e ventilação, C = Circulação e controle de sangramentos, D = exame físico e entrevista, E = exposição e incapacidades/avaliação neurológica.
- IV - A avaliação inicial da vítima de trauma (ABC) tem o objetivo de detectar e corrigir as situações que colocam a vida da vítima em risco iminente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- B () Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D () Somente a afirmativa I está correta.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

13) A hipoglicemia (nível sanguíneo de glicose anormalmente baixo) ocorre quando a glicemia cai abaixo de 50 a 60 mg/dl. Os sintomas hipoglicêmicos podem ocorrer de forma súbita e inesperada. Na hipoglicemia grave, a função do sistema nervoso central é tão comprometida que o indivíduo necessita da assistência imediata para reverter o quadro, caracterizando-se uma emergência.

Assinale a alternativa **CORRETA** que identifica os sintomas que podem estar presentes na hipoglicemia grave.

- A () bradicardia, sonolência e sudorese.
- B () ansiedade, sudorese e nervosismo.
- C () desorientação, convulsões e perda da consciência.
- D () taquicardia, tremor, vômito e sudorese.
- E () taquicardia, dificuldade de concentração e tonteira.

14) Quando ocorre um acidente de trânsito e a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é acionada, ela deve, ao chegar ao local, tomar medidas de segurança na cena e de avaliação da necessidade de recursos adicionais. Somente quando esses princípios estiverem garantidos, inicia-se o APH propriamente dito.

Sobre os objetivos principais no APH ao paciente de trauma, analise as afirmativas abaixo.

- I - Avaliar rapidamente as condições do paciente.
- II - Intervir e estabilizar rapidamente as condições que imponham ao paciente o risco de morrer, como a hipóxia, os sangramentos e a hipotermia.
- III - Decidir pelo transporte rápido e seguro para o hospital mais adequado e mais próximo.
- IV - Buscar aumentar o tempo de transporte para o hospital se o tempo na cena do evento foi minimizado.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

15) As fraturas são uma interrupção da continuidade do osso e podem ser de vários tipos. Entre algumas das manifestações clínicas mais frequentes nas fraturas fechadas, é **CORRETO** afirmar que se incluem:

- A () dor à palpação, incapacidade de movimentar-se e letargia.
- B () confusão, tontura, edema e dor.
- C () dor, perda da função do membro afetado e edema generalizado.
- D () equimose, mobilidade preservada do membro afetado e encurtamento do mesmo.
- E () dor à palpação, edema local, deformidade e perda de função do membro afetado.

16) Sobre fraturas, é **CORRETO** afirmar que:

- A () os idosos têm maior risco de sofrer fraturas por causa do envelhecimento e de doenças ósseas como a osteoporose.
- B () não é importante manter imobilizada a fratura durante o transporte.
- C () numa fratura exposta, sempre que possível, deve-se tentar recolocar o osso fraturado no local de origem.
- D () as fraturas de fêmur e de bacia não causam hemorragias graves porque o sangramento é insuficiente, mas a vítima pode entrar em estado de choque por causa da dor.
- E () as fraturas podem ser classificadas em fechadas, abertas e duvidosas.

17) A Escala de Coma de Glasgow é um método simples e rápido para a avaliação do nível de consciência.

Assinale a alternativa **CORRETA** que corresponde às três variáveis analisadas através desta escala.

- A () Abertura ocular; resposta verbal; reflexo fotomotor.
- B () Abertura ocular; resposta verbal; reflexos do tronco cerebral.
- C () Resposta verbal; abertura ocular; resposta motora.
- D () Reflexo oculocefálico; reflexo vestibulo-ocular; reflexo corneopalpebral.
- E () Abertura pupilar; resposta motora; resposta verbal.

18) Em relação à avaliação da pupila e dos reflexos do tronco cerebral no exame neurológico, analise as afirmativas abaixo.

- I - As pupilas devem ser avaliadas quanto ao seu tamanho relativo e quanto à presença de reflexo fotomotor.
- II - O reflexo fotomotor é testado aplicando-se um feixe de luz alternadamente em cada um dos olhos do paciente; a resposta é normal quando somente a pupila estimulada se contrai.
- III - É considerada normal uma pupila com diâmetro de 3 a 7 mm. Pupilas com tamanho superior a 7 mm denominam-se mióticas, e com tamanho inferior a 3 mm, midriáticas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C () Somente a afirmativa II está correta.
- D () Somente a afirmativa I está correta.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

19) Sobre as terminologias utilizadas na avaliação das pupilas quanto ao seu tamanho, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Miose = pupilas aumentadas.
- B () Isocoria = pupilas em tamanhos desiguais.
- C () Midríase = pupilas diminuídas.
- D () Anisocoria = pupilas em tamanhos iguais.
- E () Midríase = pupilas aumentadas.

20) As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do calor direto ou indireto sobre o organismo. Podem ser classificadas, segundo a profundidade ou grau de destruição celular, em queimaduras de primeiro e segundo graus superficiais ou profundas e de terceiro grau.

Sobre a classificação das queimaduras, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () A presença de eritema, bolhas e muita dor caracteriza as queimaduras de terceiro grau.
- B () A presença de eritema caracteriza as queimaduras de primeiro grau, que são indolores.
- C () As queimaduras de segundo grau atingem somente a camada superficial da pele ou epiderme. São geralmente indolores.
- D () As queimaduras de terceiro grau penetram todas as camadas da pele, incluindo músculos e vasos sanguíneos. A ausência de dor deve-se à destruição das terminações nervosas no local da lesão.
- E () As queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme e a derme; as queimaduras de segundo grau atingem o tecido subcutâneo e apresentam eritemas; as queimaduras de terceiro grau atingem todas as camadas.

21) Leia com atenção o caso abaixo.

Ao chegar à ocorrência de acidente de trânsito, a equipe de APH constatou que há uma vítima caída na pista. Trata-se de um homem de 45 anos que dirigia o veículo, não usava cinto de segurança e no impacto foi atirado contra o vidro da frente, sendo arremessado para fora do veículo. Apresenta lesões maxilofaciais graves com sangramento na boca e nariz; usa prótese dentária; apresenta ferimentos lacerantes na região frontal da cabeça, ferimento inciso com forte hemorragia no antebraço esquerdo, deformidade na tíbia e fíbula do membro direito e lesões abrasivas na face anterior do tórax. Sinais vitais: PA 70 x 40 mmhg, FC 142 bpm, FR 48 mrpm. Pele fria e sudorese.

Com base nas informações do caso, assinale a alternativa **CORRETA** sobre os problemas apresentados pela vítima.

- A () Hipertensão, taquicardia, dispneia, hipotermia e suspeita de fratura.
- B () Hipotensão, taquicardia, taquipneia e possível fratura em membro inferior direito.
- C () Hipotensão, taquicardia, taquipneia e possível fratura em membro superior direito.
- D () Hipotensão, taquicardia e sudorese, bradipneia e hipotermia.
- E () Pressão quase normal, hemorragia, taquicardia, taquipneia e suspeita de entorse em membro inferior direito.

22) De acordo com as novas recomendações de 2010 da *American Heart Association* (Associação Americana do Coração) para a frequência das compressões e a relação entre compressões e ventilações na Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em adultos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Frequência de 100/min; compressão x ventilação de 15:2.
- B () Frequência de 80/min; compressão x ventilação de 30:2.
- C () Frequência de 100/min; compressão x ventilação de 30:2.
- D () Frequência de 60 a 80/min; compressão x ventilação de 15:2.
- E () Frequência de 100/min; compressão x ventilação de 5:1.

23) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo acerca das novas recomendações de 2010 da *American Heart Association* (Associação Americana do Coração) para a Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em adultos.

- () A cadeia da sobrevida é constituída por cinco passos: reconhecimento da PCR e pedido de socorro, manobras de RCP com ênfase em compressões torácicas, desfibrilação precoce, suporte avançado de vida eficaz e cuidados organizados pós-PCR.
- () Reconhecida a PCR, devem ser iniciadas as compressões torácicas alternadas com as ventilações assistidas na sequência de 30 compressões torácicas intercaladas com duas ventilações assistidas. O ABC passou para CAB (compressões via aérea, respiração).
- () As compressões torácicas devem ser de alta qualidade e ter uma frequência mínima de 80 por minuto.
- () As compressões e as ventilações não devem ser interrompidas até a chegada do desfibrilador. Quanto mais precoce a desfibrilação, melhores são os resultados.
- () Após o choque, deve-se realizar 5 ciclos de RCP (30 compressões e 2 ventilações/ciclo) antes de checar novamente o ciclo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () V – V – V – V – V
- B () F – V – F – V – V
- C () V – F – V – F – F
- D () V – V – F – V – V
- E () F – V – F – F – F

24) Leia o texto abaixo.

Nas urgências psiquiátricas, temos que considerar a necessidade de encontrar respostas que possibilitem o melhor cuidado à pessoa com transtornos mentais, assim como condições que permitam aos profissionais desempenhar sua tarefa com segurança e dignidade.

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, sobre as habilidades preconizadas para o técnico de enfermagem em Suporte Básico de Vida (SBV) no atendimento às urgências psiquiátricas segundo a Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.

- () Reconhecer sinais de gravidade das patologias psiquiátricas em situações de urgência na cena das ocorrências.
- () Descrever ao médico regulador os sinais observados nos pacientes em atendimento.
- () Reconhecer a necessidade de acionar outros atores para atender às urgências psiquiátricas, quando implicar a segurança da equipe de APH.
- () Adotar medidas no manejo dos pacientes agressivos, psicóticos e suicidas e, quando implicar a segurança das equipes de APH (vítimas agressivas em situações de risco para si e para os outros), repassar o caso à polícia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () V – V – F – V
- B () V – V – F – F
- C () V – V – V – V
- D () F – V – F – F
- E () V – V – V – F

25) Analise as afirmativas abaixo sobre a Portaria nº 2.026, de 24 de agosto de 2011, que reformula o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

- I - A Portaria considera o SAMU como o componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências, por sua vez integrado ao SUS (Sistema Único de Saúde).
- II - Conforme a Portaria, o SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada.
- III - O agravo à saúde que deve ser atendido pelo SAMU pode ser de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, entre outras, exceto os acidentes de trânsito.
- IV - A Portaria aprova as novas diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação Médica das Urgências como componentes dos serviços privados ou particulares de Atendimento Pré-Hospitalar.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente a afirmativa II está correta.
- B () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

26) Analise as afirmativas abaixo sobre as competências/atribuições do técnico de enfermagem, conforme preconizado pela Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.

- I - Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional em urgências / emergências.
- II - Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.
- III - Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave sem qualquer supervisão do profissional enfermeiro.
- IV - Realizar manobras de extração manual de vítimas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

27) Sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conforme a Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, é **CORRETO** afirmar que:

- I - de acordo com a Portaria, a implantação de redes regionalizadas e hierarquizadas de atendimento, além de permitir uma melhor organização da assistência, articular os serviços, definir fluxos e referências resolutivas, é elemento indispensável para que se promova a universalidade do acesso, a equidade na alocação de recursos e a integralidade na atenção prestada.
- II - a Portaria aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, estabelecendo os princípios e diretrizes destes sistemas, as normas e critérios de funcionamento, bem como a classificação e cadastramento dos serviços.
- III - segundo a Portaria, torna-se imperativo estruturar os Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência de forma a envolver toda a rede assistencial, desde a rede pré-hospitalar até a rede hospitalar de alta complexidade.
- IV - o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser entendido como uma atribuição da área da saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação Médica das Urgências que deve ser de fácil acesso ao público, por via telefônica, em sistema gratuito através do número 192.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

28) Analise as terminologias e relacione-as com suas respectivas definições.

COLUNA 1	COLUNA 2
I - Melena	() Expectoração sanguínea através da tosse, proveniente de hemorragia no sistema respiratório.
II - Hematêmese	() Fezes enegrecidas e muito fétidas em consequência da digestão da hemoglobina.
III - Hemoptise	() Sangue vivo nas fezes.
IV - Enterorragia	() Vômito de sangue proveniente de hemorragia da mucosa gástrica, duodenal ou esofágica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A () III – I – IV – II
- B () III – II – IV – I
- C () I – IV – III – II
- D () I – II – III – IV
- E () IV – II – III – I

29) Sobre hemorragias, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Muitas causas de hemorragia, sobretudo hemorragias internas, são de difícil controle no ambiente pré-hospitalar. Nestes casos, é melhor transportar a vítima rapidamente para o hospital de referência em trauma, mesmo que seja o mais distante.
- B () A hemorragia de origem arterial é mais importante que a venosa, porém é controlada mais facilmente.
- C () Fazer um torniquete bem apertado é regra número um nas hemorragias, mas atenção para não deixá-lo por mais de 20 minutos.
- D () A compressão direta, no local do ferimento, e a elevação do membro afetado são os principais métodos para deter uma hemorragia no ambiente pré-hospitalar.
- E () É importante manter as extremidades com sangramento ao nível do coração.

30) Analise as afirmativas abaixo quanto às técnicas de transporte de acidentados, no atendimento pré-hospitalar.

- I - Em situações de risco iminente no local (ex. incêndios, desabamentos, tiroteios, etc.), é necessário remover a vítima rapidamente, sendo que a escolha da técnica de transporte varia com a situação, riscos no local, número de socorristas e estabilidade do paciente.
- II - Na técnica de elevar um peso, é correto: manter sempre a coluna ereta antes de elevar a vítima; dobrar os joelhos; posicionar-se de cócoras para elevá-la do solo; ficar bem próximo dela; movimentar-se sempre em conjunto com o outro socorrista.
- III - O colete de imobilização dorsal (KED) é um equipamento importante para a imobilização e transporte de vítimas de acidente de trânsito que se encontrem caídas fora do veículo, em decúbito dorsal, lateral ou ventral.
- IV - O colar cervical deve ser usado sempre em vítimas de trauma e posicionado logo após a avaliação secundária.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

31) O estado de choque hipovolêmico é um distúrbio agudo da circulação, caracterizado pela queda do volume circulante efetivo, ocasionando o desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio para os tecidos. Assinale a alternativa **CORRETA** em que todos os sinais e sintomas são típicos do choque hipovolêmico secundário a hemorragia.

- A () Hipotensão; bradicardia; taquipneia; pele fria e pegajosa.
- B () Diminuição do nível de consciência; bradicardia; bradipneia.
- C () Ansiedade; hipertensão; taquicardia; taquipneia.
- D () Confusão e letargia; taquicardia; hipotensão; taquipneia.
- E () Palidez; sudorese; bradicardia; hipotensão.

32) De acordo com a Constituição Federal, no seu Art. 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, resultando no SUS (Sistema Único de Saúde) através da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta princípios básicos do SUS.

- A () Integralidade de assistência e centralização político-administrativa.
- B () Regionalização da rede de serviços de saúde e centralização comunitária.
- C () Participação da comunidade e centralização da rede regionalizada.
- D () Descentralização da rede de serviços de saúde e hierarquização político-administrativa.
- E () Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e participação da comunidade.

33) Na ocorrência de intoxicação exógena, uma assistência rápida e eficiente pode contribuir para diminuir a absorção dos tóxicos. Sobre a abordagem do paciente com Intoxicação Exógena Aguda, é **CORRETO** afirmar que:

- A () se a intoxicação ocorreu através da pele, deve-se retirar todas as roupas do paciente, remover quaisquer resíduos tóxicos que se encontrem sobre a pele e induzir o vômito.
- B () a maioria das intoxicações envolve o trato gastrointestinal e as medidas possíveis de escolha para minimizar a ação do agente tóxico são utilizar carvão ativado, lavagem gástrica, irrigação intestinal, hiper-hidratação e alcalinização da urina.
- C () a lavagem gástrica deve ser realizada administrando-se pela sonda grandes volumes de soro glicosado a 5%, mantendo-se a sonda fechada por um breve período para depois abri-la.
- D () a lavagem gástrica é realizada através da passagem de uma sonda nasogástrica de médio calibre, mantendo-se o paciente em decúbito lateral direito com a cabeça em nível superior ao corpo para facilitar a drenagem.
- E () após 30 minutos da ingestão de medicamentos, raramente há indicação de proceder a uma lavagem gástrica porque sua eficácia depende do tempo de ingestão do tóxico.

34) O termo crise epilética descreve uma situação em que existe uma descarga excessiva e síncrona de um grupo neuronal. Quando se manifesta externamente por um fenômeno de natureza predominantemente motora (tônico, clônico ou mioclônico), é chamada de convulsão. Sobre crise convulsiva, analise as afirmativas abaixo.

- I - Os princípios gerais na abordagem de vítimas com convulsões são prevenir ferimentos e assegurar uma via aérea pérvia, mantendo-a em decúbito lateral para impedir a aspiração de secreções e sangue.
- II - Não se deve conter ou segurar a vítima durante a crise convulsiva, pois isso pode provocar fratura ou outro tipo de traumatismo, apenas proteger sua cabeça colocando um apoio.
- III - Após a convulsão, deve-se colocar a vítima em posição de recuperação, proporcionando-lhe algum grau de privacidade. Mas atenção: não é comum a vítima ficar confusa ou não responsiva por algum tempo após a convulsão.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D () Somente a afirmativa II está correta.
- E () Somente a afirmativa I está correta.

35) As prioridades na avaliação e na conduta da criança são as mesmas do adulto. Entretanto, a criança apresenta diferenças anatômicas, fisiológicas e psicológicas que repercutem na evolução e no manejo das emergências pediátricas e por isso se deve adotar abordagem diferenciada. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que o pulso preferencial a ser aferido na reanimação cardiopulmonar em um lactente (menor de um ano) em parada cardiorrespiratória é o:

- A () poplíteo.
- B () ulnar.
- C () radial.
- D () braquial.
- E () carotídeo.

36) Luxações são lesões em que a extremidade de um osso que compõe uma articulação é deslocada de seu lugar, causando dano aos tecidos moles e afetando vasos sanguíneos, nervos e a cápsula articular. Assinale a alternativa **CORRETA** em que todos os sinais e sintomas são típicos da luxação.

- A () Fratura incompleta do osso; crepitação; dor.
- B () Dor muscular; queimação imediata; inchaço.
- C () Hematoma; dor local; fratura incompleta do osso.
- D () Lesão dos ligamentos articulares; eritema; crepitação.
- E () Dor; deformidade; incapacidade de movimentar-se.

37) O Edema Agudo de Pulmão (EAP) é definido como um acúmulo anormal de líquido no tecido pulmonar e/ou alveolar. No atendimento de emergência ao indivíduo com EAP no ambiente pré-hospitalar em nível de suporte básico, assinale a alternativa **CORRETA** que compreende os cuidados de enfermagem prioritários, visando restabelecer a função respiratória.

- A () Manter a permeabilidade das vias aéreas, instalar oxigênio e posicionar o paciente em decúbito lateral para melhorar a capacidade de bombeamento do ventrículo esquerdo.
- B () Manter a permeabilidade das vias aéreas, posicionar o paciente com a cabeceira da maca elevada entre 60º e 90º e instalar oxigênio.
- C () Instalar oxigênio, manter a permeabilidade das vias aéreas e posicionar o paciente em decúbito dorsal para eliminar qualquer esforço físico.
- D () Manter o paciente na posição ereta com as pernas pendentes, instalar ar comprimido e administrar medicação prescrita.
- E () Controlar ansiedade, instalar oxigênio, realizar eletrocardiograma e providenciar as medicações em uso.

38) Em uma ocorrência de festa de fim de ano, havia dois indivíduos seriamente alcoolizados, sendo um deles cardiopata crônico. Foi acionada uma Unidade de Suporte Básico (USB) e outra de Suporte Avançado (USA). No local, enquanto o enfermeiro atendia o indivíduo com cardiopatia, o técnico de enfermagem se ocupou daquele menos grave, para o qual o médico prescreveu a administração de 15 ml de uma solução de glicose a 25%. Entretanto, na USA estavam disponíveis somente ampolas de 20 ml de glicose hipertônica a 50%.

Identifique qual o volume de glicose a ser utilizado, de acordo com a prescrição.

- A () 6 ml
- B () 7,5 ml
- C () 10 ml
- D () 12 ml
- E () 15 ml

39) A Síndrome Coronária Aguda (SCA) é uma importante urgência clínica para o atendimento pré-hospitalar e representa uma das principais causas da dor torácica.


Sobre os sinais e sintomas da SCA que sugerem isquemia miocárdica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A () Dor, desconforto, queimação ou sensação opressiva localizada em região precordial ou retroesternal, que pode irradiar para o ombro e/ou braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, acompanhada frequentemente de diaforese, palpitações, náuseas, vômitos ou dispneia.
- B () Dor em aperto, pressão, queimação, desencadeada por pesadelo e aliviada quando a pessoa se acorda.
- C () A dor pode durar alguns minutos (geralmente entre 5 e 10 minutos) ou mais que uma hora no infarto.
- D () Em algumas ocasiões, a dor pode se localizar em região epigástrica, o que significa uma dispepsia, problema comum de acontecer concomitantemente à SCA.
- E () Dor, desconforto, sensação opressiva localizada em região posterior do tórax que pode irradiar para o ombro e/ou braço direito, pescoço ou mandíbula, acompanhada frequentemente de palpitações, náuseas, vômitos, taquicardia e hipotermia.

40) Numa ocorrência de trânsito para a qual a Unidade de Suporte Básico (USB) foi acionada, a vítima encontrava-se com vários ferimentos superficiais com sangramento. Avisou prontamente o técnico de enfermagem para que tomasse cuidado, pois era portadora de uma doença infectocontagiosa transmissível pelo sangue, mas pediu: “Por favor, não revele a minha doença em hipótese nenhuma”. Considerando o dever do sigilo profissional, assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta a circunstância em que o técnico de enfermagem poderá revelar o “segredo” da vítima, de acordo com o Código de Ética em Enfermagem.

- A () A qualquer um, mesmo que o paciente não tenha permitido.
- B () À autoridade judicial quando for intimado como testemunha, visto que neste caso o profissional não poderá declarar seu impedimento de revelar o “segredo”.
- C () Aos pais da vítima, se esta for menor de idade, desde que tenha capacidade de discernimento.
- D () Quando necessário à prestação da assistência, em atividade multiprofissional.
- E () A qualquer um, caso a vítima venha a falecer.

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)



QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				